

## &lt;アクセルキングフロアブル(変更作物網掛け)&gt;

## 【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用 方法	トルフェンピラト を含む 農薬の総 使用回数	メフルミゾン を含む 農薬の総 使用回数
キャベツ	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ ハスモンヨトリ、オオタバコガ ウリバ類、ハイマダラノメカ アブラムシ類、ネキアザミウマ	1000倍	100~ 300L /10a	収穫14日 前まで	2回 以内	散布	2回以内	3回以内
はくさい	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ ハイマダラノメカ、アブラムシ類 ナモクシバエ、ネキアザミウマ							
だいこん	コナガ、アオムシ、ハイマダラノメカ ヨトウムシ、アブラムシ類 キスジノミハムシ、ナモクシバエ	1500倍						
レタス	オオタバコガ、アブラムシ類 ナモクシバエ、ハスモンヨトリ	1000~1500倍		収穫3日 前まで	3回以内			
	ヨトウムシ、ウリバ類	1500倍		収穫14日 前まで				
非結球レタス	オオタバコガ、アブラムシ類 ナモクシバエ	1000~1500倍			2回以内			
	ハスモンヨトリ、ヨトウムシ、ウリバ類	1500倍						
花き類・観葉植物 (きくを除く)	アブラムシ類、オオタバコガ アザミウマ類	1000倍	発生初期	4回 以内	4回以内	6回以内		
きく	アブラムシ類、オオタバコガ アザミウマ類、ハスモンヨトリ ナモクシバエ類							

## 【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用 方法	トルフェンピラト を含む 農薬の総 使用回数	メフルミゾン を含む 農薬の総 使用回数	
キャベツ	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ ハスモンヨトリ、オオタバコガ ウリバ類、ハイマダラノメカ アブラムシ類、ネキアザミウマ	1000倍	100~ 300L /10a	収穫14日 前まで	2回 以内	散布	2回以内	3回以内	
はくさい	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ ハイマダラノメカ、アブラムシ類 ナモクシバエ、ネキアザミウマ								
レタス	オオタバコガ、アブラムシ類 ナモクシバエ、ハスモンヨトリ	1000~1500倍							
花き類・観葉植物 (きくを除く)	アブラムシ類、オオタバコガ アザミウマ類	1000倍		発生初期	4回 以内			4回以内	6回以内
	アブラムシ類、オオタバコガ アザミウマ類、ハスモンヨトリ ナモクシバエ類								

以上