

<ハチハチ乳剤(変更作物網掛け)>

【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用 方法	トフェビト を含む 農薬の総使 用回数			
キャベツ	アザミヤカ類	1000倍	100~ 300L /10a	収穫14日前まで	2回 以内	散布	2回以内			
はくさい	ハイダラノメイガ、コガ アオシ、アブラムシ類	1000~2000倍								
レタス	アブラムシ類、ナメコリハエ	1000倍		収穫3日前まで						
非結球レタス	アブラムシ類、ナメコリハエ	1000~2000倍		収穫14日前まで						
だいこん	ナメコリハエ、べと病	1000倍								
	アオシ、コガ、アブラムシ類 キジノミハシ、ハイダラノメイガ ナメコリハエ、カブラハチ	1000~2000倍								
かぶ	白さび病、ワカ症	1000倍		収穫7日前まで						
	キジノミハシ、コガ	1000~2000倍								
	ハイダラノメイガ、ナメコリハエ アブラムシ類	2000倍								
きゅうり	カブラハチ、白さび病	1000倍		100~ 300L /10a				収穫前日まで	2回 以内	株元 散布
	ウリノメイガ、アブラムシ類 アザミヤカ類、コジラミ類	1000~2000倍								
にがうり	うどんこ病、べと病、褐斑病	1000倍						収穫前日まで		
すいか	アザミヤカ類	1000倍								
なす	うどんこ病、コジラミ類	1000~2000倍						収穫前日まで		
	アブラムシ類、アザミヤカ類 コジラミ類、マメコリハエ	1000~2000倍								
	チャノホリダニ	1000~4000倍								
トマト	フェクロハネキノコハエ	1000倍	収穫前日まで							
	うどんこ病	1000倍								
ミニトマト	アブラムシ類、コジラミ類 アザミヤカ類、トマサビダニ	1000~2000倍	収穫前日まで							
ばれいしょ	アブラムシ類、トマサビダニ	2000倍								
ねぎ	アブラムシ類、アザミヤカ類、ナストビハシ	1000倍	収穫3日前まで							
ブロッコリー	アザミヤカ類、アブラムシ類、コガ	1000~2000倍								
ピーマン	アザミヤカ類	1000倍								
にんにく	チャノホリダニ、コジラミ類 うどんこ病	1000倍	収穫前日まで							
	ネコカ、チュリップサビダニ アザミヤカ類、アブラムシ類									
にら	アザミヤカ類	1000倍	収穫7日前まで							
茶	ネコアザミヤ	1000~1500倍	収穫14日前まで							
	チャノキアザミヤ チャノミトリヒメコハエ、チャノホリ チャノホリダニ、チャノサビダニ チャノコジラミ、マダラカサハラハシ ツマクワカサミカ									
きく	アブラムシ類、アザミヤカ類	1000倍	発生初期	4回 以内	4回以内					
	ナメコリハエ類 白さび病		発病初期							

<ハチハチ乳剤(変更作物網掛け)>

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用 方法	トルフェンピラト を含む 農薬の総使 用回数
キャベツ	アザミヤ類	1000倍	100~ 300L /10a	収穫14日 前まで	2回 以内	散布	2回以内
はくさい	ハイマダラノメイ、コガ アオムシ、アブラムシ類	1000~2000倍					
レタス	アブラムシ類、モグリハエ ナメクジ類、べと病	1000倍					
だいこん	アオムシ、コガ、アブラムシ類 キスジノミハムシ、ハイマダラノメイ モグリハエ、カブラハチ	2000倍					
かぶ	キスジノミハムシ、コガ ハイマダラノメイ、モグリハエ アブラムシ類						
きゅうり	ウリノメイ、アブラムシ類 アザミヤ類、コジラミ類 うどんこ病、べと病、褐斑病	1000~2000倍					
にがうり	アザミヤ類	1000倍					
すいか	うどんこ病、コジラミ類 アブラムシ類、アザミヤ類	1000~2000倍					
ばれいしょ	アブラムシ類、ナストビハムシ	2000倍					
ねぎ	アザミヤ類、アブラムシ類 ネコカ、シロイモシヨウ、さび病、 べと病	1000倍					
ブロッコリー	アオムシ、アブラムシ類、コガ	1000~2000倍					
ピーマン	アザミヤ類 チャノホリガニ、コジラミ類 うどんこ病						
にんにく	ネコカ、チュリップサビダニ アザミヤ類、アブラムシ類	1000倍					
にら	ネコアザミヤ						
茶	チャノキアザミヤ チャノミドリメコハイ、チャノホリガ チャノホリガニ、チャノサビダニ チャノコジラミ、マダラカサハラハムシ ツマクアオカスミカ	1000~1500倍	200~ 400L /10a	摘採14日 前まで	1回		1回
きく	アブラムシ類、アザミヤ類 モグリハエ類 白さび病	1000倍	100~ 300L /10a	発生初期 発病初期	4回 以内		4回以内