

<ハチハチフロアブル(変更作物網掛け)>  
【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用 方法	トルフェンピラト を含む 農薬の総 使用回数
なし	シシトムシ類	1000倍	200~ 700L /10a	収穫14日 前まで			
	アブラムシ類、ニセシシトムシ、アザミウマ類	2000倍					
	クワコナカイラムシ	1000~2000倍					
かんきつ	シシトムシ類	2000~3000倍	200~ 700L /10a	収穫前日 まで			
	アブラムシ類、チャノホリダニ、カネナキ	2000倍					
	アザミウマ類	1000~2000倍					
	コマダラカミキリ、コナカイラムシ類、コナジラミ類	1000倍					
	シシトムシ類、ヨモギエダシヤク、ヨコバイ類 シシトムシ成虫						
すもも	アブラムシ類	2000倍	100~ 300L /10a	収穫7日 前まで			2回以内
もも ネクタリン	シシトムシ類	1000~2000倍					
	アブラムシ類、モモホコリガ、モモシシトムシ	2000倍					
	アザミウマ類	1000倍					
さやえんどう 実えんどう	ナメクジ類	1000~2000倍	100~ 300L /10a	収穫14日 前まで			
キャベツ	うどんこ病	1000倍					
	コナジ、アオムシ、アブラムシ類 ハマダラカミキリ、アザミウマ類						
はくさい	コナジ、アオムシ、ハマダラカミキリ、キスジノミハムシ ダコノサカハムシ	1000~2000倍	100~ 300L /10a	収穫3日 前まで			
	アブラムシ類						
レタス	アブラムシ類、ナメクジ類	1000倍	100~ 300L /10a	収穫14日 前まで			
	ヒメダラコナジ、ナメクジ類						
非結球レタス	アブラムシ類、ナメクジ類	1000~2000倍	100~ 300L /10a	収穫前日 まで			
セルリー	アブラムシ類、ナメクジ類	2000倍					
いちご	アブラムシ類、アザミウマ類、クワノホコリガ チャノホリダニ、うどんこ病	1000倍	100~ 300L /10a	収穫前日 まで			
なす	アブラムシ類、アザミウマ類、コナジラミ類 ナメクジ類、チャノホリダニ、うどんこ病						
すいか	アブラムシ類	1000~2000倍	100~ 300L /10a	収穫前日 まで			
	アザミウマ類、うどんこ病						
トマト ミニトマト	アブラムシ類、コナジラミ類、アザミウマ類 トマトシシトムシ、葉かび病、うどんこ病	1000倍	100~ 300L /10a	収穫前日 まで			
アスパラガス	ナメクジ類、アブラムシ類 コナジラミ類、シシトムシ類、カネナキ						
茶	チャノホコリガ、チャノミドリヒメコナジ	1000~1500倍	200~ 400L /10a	摘採14日 前まで	1回		1回
	チャノホコリダニ、チャノカサシシトムシ	1000倍					
	マダラカサハラハムシ、チャノコナジラミ						
花き類・ 観葉植物	アザミウマ類	1000倍	100~ 300L /10a	発生初期	4回 以内		4回以内
チューリップ	アブラムシ類	1000~2000倍	300L /10a		3回 以内		
	チューリップシシトムシ	500倍	—	掘取後~ 植付前	1回	15 分間 球根 浸漬	

<ハチハチフロアブル(変更作物網掛け)>

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用 方法	トクフェンピラト を含む 農薬の総 使用回数		
なし	アブラムシ類、ニセアブラムシ、アザミウマ類、クワコカイトラムシ	2000倍	200～ 700L /10a	収穫30日 前まで	1回	散布	1回		
かんきつ	ミカンアブラムシ	2000～3000倍		1000～2000倍	収穫前日 まで		2回 以内	2回以内	
	アブラムシ類、チャノホコリダニ、カネタビ	2000倍							
	アザミウマ類	1000～2000倍							
	ゴマダラカミキリ、コカイトラムシ類、コナジラミ類 ミカンアザミウマ、モキエダシヤク、ヨコバイ類 ミカンアエ成虫	1000倍							
すもも	アブラムシ類	2000倍		収穫14日 前まで	100～ 300L /10a		1回	1回	
もも ネクタリン	シロカビ類	1000～2000倍		収穫前日 まで					
	アブラムシ類、モモアザミウマ、モモアブラムシ	2000倍							
	アザミウマ類	1000倍							
さやえんどう 実えんどう	ナメクジハエ うどんこ病	1000～2000倍		1000～2000倍					収穫14日 前まで
キャベツ	コナジラミ、アブラムシ類 ハイマダラカミキリ、アザミウマ類	1000倍							
	コナジラミ、アブラムシ類、ハイマダラカミキリ、 アザミウマ類	1000～2000倍							
はくさい	アブラムシ類	1000～2000倍	1000倍			収穫14日 前まで			
	アブラムシ類、ナメクジハエ	1000倍							
レタス	アブラムシ類、ナメクジハエ	1000倍	2000倍	収穫30日 前まで		2回 以内			2回以内
非結球レタス	アブラムシ類、ナメクジハエ	1000倍							
セルリー	アブラムシ類、ナメクジハエ	2000倍	1000倍	1番花の 開花まで	1回	1回			
いちご	アブラムシ類、アザミウマ類 カキヒメヨコバイ、チャノホコリダニ、うどんこ病	1000倍							
すいか	アブラムシ類 アザミウマ類、うどんこ病	1000～2000倍	100～ 800L /10a	収穫前日 まで	2回 以内	2回以内			
アスパラガス	ネキアザミウマ、アブラムシ類、コナジラミ類 ジュウホシカミキリ	1000倍							
茶	チャノキアザミウマ、チャノミドリヒメヨコバイ チャノホコリダニ、チャノカネタビ	1000～1500倍	200～ 400L /10a	摘採14日 前まで	1回	1回			
	マダラカミキリ、チャノコナジラミ	1000倍							
花き類・ 観葉植物	アザミウマ類	1000倍	300L /10a	発生初期	4回 以内	4回以内			
チューリップ	アブラムシ類	1000～2000倍			3回 以内				
	チューリップ	チューリップアブラムシ	500倍	—	掘取後～ 植付前	1回	15 分間 球根 浸漬		