



平成26年11月17日付で
登録内容が変更になりました。

※ジェイエース剤をご使用の際は、
以前にご購入された製品に
つきましても、登録内容を
ご確認のうえご使用
ください。



ジェイエース粒剤

農薬登録の削除作物について

ジェイエース粒剤では、
下表①の登録作物が削除されました。

下表①の作物ではジェイエース粒剤の
使用をしないでください。

■表① ジェイエース粒剤（登録番号 第20939号）
平成26年11月17日 登録変更後（作物削除）

作物名 **ミニトマト**

全農

登録商標 第4702318号

使用方法が変更となった作物

キャベツ・はくさい・ブロッコリー・だいこん・かぶ・なばな・きゅうり・トマト・なす
みずな・ばれいしょ・こまつな・チンゲンサイ

ジェイエース粒剤では、下表②の登録が変更になりました。

今後は、下表②の使用方法のとおりジェイエース粒剤を使用してください。

■表② ジェイエース粒剤（登録番号 第20939号）平成26年11月17日 登録変更後（変更作物は 部分、変更は赤字部分）

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数
キャベツ	アオムシ コナガ ヨトウムシ	3～6kg/10a (1株当たり1～2g)	定植時	1回	植穴処理	2回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後の散布は1回以内)
はくさい	アブラムシ類	6kg/10a(1株当たり2g)			株元散布	
ブロッコリー	ヨトウムシ		3～4kg/10a	は種前	1回	作条散布
だいこん	アオムシ コナガ アブラムシ類	4kg/10a 6kg/10a(1株当たり2g)				収穫21日前まで 定植時
かぶ	アブラムシ類		土壌混和处理			
なばな	アブラムシ類	3～6kg/10a (1株当たり1～2g)	定植時	1回	作条散布又は 植穴処理	1回
きゅうり	オンシツコナジラミ アブラムシ類 アザミウマ類					
トマト	アブラムシ類 オンシツコナジラミ	3～6kg/10a (1株当たり1～2g)	定植時	1回	作条散布又は 植穴処理	1回
なす	アブラムシ類 オンシツコナジラミ アザミウマ類					
ごぼう	アブラムシ類	3～6kg/10a	収穫75日前まで	1回	株元散布	2回以内 (株元散布は1回以内、散布は1回以内)
みずな	アブラムシ類	3～6kg/10a	定植時	1回	作条散布後土壌混和	3回以内 (植付時の処理は1回以内、植付後は2回以内)
ばれいしょ			植付時		作条散布	
こまつな			は種前		作条散布後土壌混和	
チンゲンサイ			定植時			
たばこ	ヨトウムシ アブラムシ類	3～6kg/10a	移植前	1回	作条散布後土壌混和	2回以内
きく	アブラムシ類 アザミウマ類 マメハモグリバエ	6～9kg/10a	発生初期	5回以内	株元散布	5回以内
ばら	アブラムシ類	1株当たり1～2g				
トルコギキョウ	アザミウマ類					
ゆり	アブラムシ類					
りんどう	アザミウマ類	1株当たり2g				
つつじ類	ツツジゲンバイ					
芝	スジキリヨトウ シバツトガ	10kg/10a	全面散布	5回以内		
	タマナヤガ	5～10kg/10a				